

## Tratamento cirúrgico de terceiro molar portador de microdontia: Relato de caso

Daniel Augusto Moreira CAMPOS<sup>1</sup>, Stella Roque ARAUJO<sup>2</sup>, Cristiano De Oliveira LIMA<sup>3</sup>, Kelly Oliva JORGE<sup>4</sup>, Alfonso GALA-GARCIA<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Estudante de Odontologia/UNINCOR – [dan-amc@hotmail.com](mailto:dan-amc@hotmail.com)

<sup>2</sup>Estudante de Odontologia/UNINCOR

<sup>3</sup>Estudante de Odontologia/UNINCOR

<sup>4</sup>Professora do Curso de Odontologia/UNINCOR -

<sup>5</sup>Orientador e Professor do Curso de Odontologia/UNINCOR -  
[prof.alfonso.garcia@unincor.edu.br](mailto:prof.alfonso.garcia@unincor.edu.br)

**Palavras-Chave:** Microdontia, terceiro molar.

### RESUMO

Microdontia é uma condição em que os dentes são menores do que o tamanho normal, podendo envolver todos os dentes, ser limitada a um único dente ou a um grupo de dentes. Os dentes individuais, mais frequentemente afetados são os incisivos laterais superiores e os terceiros molares superiores e frequentemente é associada com a hipodontia. Este trabalho tem por objetivos descrever e discutir um caso clínico cirúrgico de um terceiro molar portador de microdontia incluso. Relato de Caso: Paciente melanoderma de sexo masculino com 38 anos de idade se apresentou na Clínica Integrada Odontológica da Universidade Vale do Rio Verde - UNINCOR queixando de dor e inflamação na região retromolar superior direita, próximo do elemento 17. Foram realizados os exames clínicos e imaginológicos complementários panorâmicos e periapicais. Os resultados das imagens mostraram a presença de uma massa mineralizada compatível com um molar mas de tamanho menor do que o normal, um micromolar. O tratamento indicado foi a remoção cirúrgica do micromolar incluso para evitar possíveis associações com outras lesões patológicas, infecção, lesões aos dentes vizinhos, dor e erupção ectópica no local. Foi realizada a técnica convencional conservadora com exposição do campo cirúrgico na região retromolar próximo a distal do elemento 17. A cirurgia foi realizada com sucesso e o micromolar foi removido e enviado para exame histopatológico para descartar possíveis associações com outras anomalias dentárias ou com lesões patológicas. Podemos concluir que nos casos de achados de dentes inclusos portadores de microdontia, está indicada a remoção cirúrgica para evitar possíveis complicações futuras.